

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

"Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001"

Settore Prevenzione di Bergamo - Ufficio Sanità Pubblica

Responsabile: Dr. Massimo Giannetta

Via Borgo Palazzo n. 130 - 24125 Bergamo ☎ 035-2270535

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it

posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it

Alla CA della Dirigente Prof **Barbara Mazzoleni**

IC Camozzi-Bergamo

Pec dirigente@iccamozzi.pec.gov.it

Gentilissima,

Come da accordi telefonici intercorsi, si invia Nota informativa sulla Ossiuriasi.

A disposizione per qualsiasi altra necessità, cordiali saluti.

Dott.ssa Carmen Tereanu

AGENZIA DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Il Dirigente Massimo Giannetta
Dott.ssa CARMEN TEREANU

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

"Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001"

Settore Prevenzione di Bergamo - Ufficio Sanità Pubblica

Responsabile: Dr. Massimo Giannetta

Via Borgo Palazzo n. 130 - 24125 Bergamo ☎ 035-2270535

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it

posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it

SCUOLA DELL'INFANZIA MONTEROSSO

Viale Giulio Cesare, 58

AVVISO AI GENITORI E AL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA

Gentilissimi,

Si comunica che sono stati segnalati presso lo scrivente Ufficio alcuni casi di ossiuriasi negli alunni della scuola materna. Con la presente nota vogliamo cogliere l'occasione per darVi alcune informazioni sulla malattia e sui provvedimenti da adottare.

Cos'è

L'ossiuriasi è un'infestazione intestinale provocata da piccolissimi vermi, gli ossiuri, a forma di spillo. Si manifesta con prurito alla zona anale, più raramente alla vulva, disturbi del sonno e irritabilità, ma spesso è asintomatica.

È diffusa in tutto il mondo e frequentemente interessa i bambini in età scolare e prescolare. L'uomo è l'unico ospite; gli animali domestici non sono contagiati.

L'uomo ingerisce le uova: in un periodo di uno - due mesi la femmina adulta di ossiuro gravida raggiunge la zona perianale dove deposita le uova.

Come si trasmette

Le femmine di ossiuri gravide di norma muoiono dopo aver depositato le uova. Il periodo di contagiosità dura fino a che le femmine depongono le uova e le uova rimangono infettive negli ambienti chiusi. Si trasmette principalmente per via oro-fecale: le uova sono trasportate attraverso le mani e le dita e attraverso oggetti contaminati (giocattoli, lenzuola, biancheria, copri sedili di WC).

Cosa fare se si verifica un caso

La diagnosi viene effettuata ponendo del nastro adesivo trasparente nella zona perianale e successivamente ricercando al microscopio le uova di ossiuro (scotch test).

Un corretto comportamento di igiene personale previene dal contagio: lavare le mani prima di mangiare o di preparare il cibo, e dopo aver utilizzato i servizi igienici.

Nel caso in cui una persona sia infestata dagli ossiuri è necessario assumere la terapia specifica, secondo le indicazioni del curante; cambiare le lenzuola e quotidianamente la biancheria intima, lavando tutto in lavatrice a 60°C.

Cosa non è necessario fare

Non è necessario l'allontanamento dalla scuola o da altra collettività.

In caso di sintomi, si suggerisce di contattare il medico o pediatra di base, esibendo la presente nota.

A disposizione per qualsiasi necessità, cordiali saluti.



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Il Dirigente Medico
Dot.ssa CARMEN TURKANO